



FRUITFOG® -CIPC

BOTE FUMIGENO ANTIGERMINATIVO PARA TRATAMIENTO DE PATATAS ALMACENADAS

Utilidad:

Bote fumígeno antigerminativo a base de CLORPROFAM (CIPC) para tratamiento postcosecha de patatas, excepto las destinadas a siembra, en cámaras, almacenes y locales de conservación. Evita la germinación y brotación de las patatas, producida durante conservaciones prolongadas.

Composición:

CLORPROFAM (CIPC)25.0% p/p (250 g/Kg)

Propiedades:

Aspecto: Polvo esponjoso de color blanco grisáceo

Olor: Característico

Densidad aparente (Kg/L): 0.587 – 0.687

Modo de empleo y dosis:

Modo de empleo: FRUITFOG-CIPC. Determinar la cantidad de patatas a tratar y utilizar el número de botes necesario según la dosis recomendada.

Quitar el tapón verde de la parte superior del bote (si procede, según la capacidad del bote) y prender fuego a la mecha. Cerrar el recinto y mantener cerrado durante al menos 12 horas. Antes de la re-entrada de personas en el local, airear durante al menos 1 hora.

No dejar el bote cerca de materiales inflamables.

Dosis:

Tratamiento inicial: 1 bote de 600g de fumígeno / 10 Tm de patatas a tratar

Re-tratamiento: 1 bote de 600g de fumígeno / 20 Tm de patatas a tratar (cada 2-3 meses)

Plazo de seguridad hasta la venta o elaboración de las patatas tratadas: 30 días

No tratar patatas destinadas a siembra.

Presentación:

Botes metálicos. Contenido neto: 300, 600, 2400 y 6000 gramos de fumígeno

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 23137.

Fecha de revisión: 11/2014

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

